

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES 2014

Division des Professions de Santé et des Professions sociales
Section de la formation de l'infirmier et des sciences de la santé

BRANCHE : COSPI

DATE : 19 mai 2014

DURÉE : 2 heures

➤ Seulement des réponses compréhensibles et claires, ainsi qu'une orthographe correcte de la terminologie professionnelle, sont dotées des points prévus

➤ Une question portant sur une citation et une explication est considérée comme une entité et ne sera pas notée séparément

5 ➤ BDS = bénéficiaire de soins / PI = problème infirmier / IP = intervention propre / PM = prescription médicale

Liste de questions /60p

Le besoin fondamental de l'homme de respirer (6,5 p)

1. Définissez « stridor expiratoire». 1,5 p

2. Mme A. est hospitalisée dans une chambre double et elle souffre d'une dyspnée d'effort
 - a. Décrivez la classification de la dyspnée selon laquelle vous pouvez déterminer le stade de dyspnée à l'effort de Mme A. 3 p
 - b. En cas de dyspnée aigue importante de Mme A., citez 4 interventions infirmières sur IP différentes. 2 p

PI : Intolérance à l'activité (3 p)

3. Citez et expliquez 3 causes différentes menant à une augmentation des besoins en O₂ de l'organisme. 3 p

Oxygénothérapie (9,5 p)

4. Mr L. est sous oxygénothérapie par lunettes d'oxygène.
 - a. Citez un PI auquel est exposé Mr L. suite au port des lunettes à O₂. 0,5 p
 - b. Décrivez 4 interventions infirmières sur IP différentes afin de prévenir ce PI chez Mr L. 2 p



- c. Comme Mr L. est sous oxygénothérapie, il nécessite une surveillance particulière. Précisez les observations ciblées auprès du BDS pour reconnaître des complications le plus tôt possible. **7 p**

Le besoin fondamental de l'homme de manger et boire (3 p)

5. Définissez « fringale » en donnant un exemple. **1 p**
6. Le poids corporel de Mme R. doit être mesuré tous les 2 jours. Citez 4 conditions préalables à la mesure afin de pouvoir comparer les valeurs obtenues. **2 p**

PI : Risque de déshydratation (3 p)

7. Mr B., 88 ans, a un risque de déshydratation plus élevé résultant de son attitude de personne âgée. Citez et expliquez 4 facteurs de risque différents pouvant influencer ce risque chez Mr B.. **2 p**
8. Citez 2 signes aggravants observables d'une déshydratation considérée comme une situation d'urgence. **1 p**

PI : Risque d'- et atteinte à la muqueuse buccale (6 p)

9. Décrivez les signes observables d'une **mycose buccale** et citez 3 causes possibles différentes. **4 p**
10. Citez 4 interventions infirmières différentes pour stimuler la production de salive. **2 p**

Le besoin fondamental de l'homme de communiquer (4 p)

11. Définissez « dysphonie ». **1 p**
- 12.a. Afin de garantir des échanges sociaux corrects avec une personne présentant des troubles du langage, citez 3 conseils différents que vous pouvez suivre. **1,5 p**
- b. Afin de garantir des échanges sociaux corrects avec un BDS présentant une désorientation, citez 3 conseils différents que vous pouvez suivre. **1,5 p**

PI : Risque de compression neurovasculaire (6 p)

13. Citez 2 situations différentes pouvant être à l'origine d'une pression dans les tissus. **1 p**
14. La compression peut se faire au niveau des nerfs et des vaisseaux sanguins. Citez les signes de compression en cas de compression **5 p**
- a. des nerfs
 - b. des vaisseaux sanguin veineux
 - c. des vaisseaux sanguins artériels

